

## PASO 1

İ Ö ŒÜŒ VOUÖÖŠÁÜÜÖÖÖQ ÖP VUÁ

### < 579F

!C^\*g!^•^Á^Ácæ^!Á^ææ[ Á~ Áæ~ ^cÁ^Á  
] ]^ æææ} Á^Á JZ<YUH

-Se le proporcionarán todos los suministros e instrucciones necesarios. Siga las instrucciones proporcionadas.

-Debe haber recibido:

- Preparación intestinal SI : @J9
- A=F5 @L'

### BC' < 579F

-No se inyecte su medicamento semanal GLP-1.  
-No tome su anticoagulante recetado. Se le habrán dado instrucciones sobre cuándo suspender este medicamento antes del procedimiento.  
**-Si no ha recibido instrucciones específicas, llámenos inmediatamente al (530) 246-7000.**

## PASO 2

### 3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

#### HACER

- Después del almuerzo: Mezcle 2 sobres de **MIRALAX** (34g) en 8 a 16 oz de agua, Gatorade o jugo natural. Repita este paso los siguientes 2 días.
- Confirme que tendrá un conductor el día del procedimiento.

#### NO HACER

- No coma alimentos ricos en fibra (estará en una dieta baja en residuos en este día y pasará a una dieta blanda mañana).
- Evite nueces y semillas.

## PASO 3

### 1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO

#### HACER

- Comience una **dieta de líquidos claros** por la mañana y continúe así hasta 3 horas antes de su procedimiento.
- Si toma medicamentos para la diabetes, consulte la guía de medicamentos para diabéticos incluida en su paquete de preparación

#### NO HACER

No coma alimentos sólidos ni consuma productos lácteos, alcohol o productos de color rojo/morado.

### INSTRUCCIONES PARA SUFLAVE®

**PASO 1:** SUFLAVE es un régimen de dosis divididas. Tomará la Dosis 1 hoy y la Dosis 2 cinco horas antes de su procedimiento.

- Llene cada recipiente plástico del kit con agua tibia (hasta la línea indicada).
- Vacíe el contenido de un sobre en cada recipiente, cierre y agite para disolver.
- Refrigere hasta que esté listo para usar.

**PASO 2:** A las **5:00 p.m.**, comience con **el primer recipiente**, bebiendo 8 oz de la solución hasta terminar. 30–60 minutos después, beba 16 oz adicionales de agua.

**Si siente náuseas, hinchazón o calambres, deténgase y beba más agua hasta que los síntomas disminuyan. Termine toda el agua en las siguientes 2 horas.**

**\*\*Puede beber líquidos claros hasta 3 horas antes de su procedimiento\*\***

## PASO 4

### DÍA DEL PROCEDIMIENTO

#### HACER

Tome sus medicamentos matutinos habituales con pequeños sorbos de agua. ESPECIALMENTE sus medicamentos para la presión arterial.

Consulte la guía de medicamentos para diabéticos

#### NO HACER

No coma alimentos sólidos ni consuma productos lácteos, alcohol o productos de color rojo/morado

#### 5 HORAS ANTES DE LLEGAR:

Beba la segunda parte de la mezcla de **SUFLAVE**.  
**Sus evacuaciones intestinales deberán ser líquidas y claras/amarillas o similares a la orina.**

#### 3 HORAS ANTES DE LLEGAR:

-NO CONSUMA MAS LÍQUIDOS  
-NO consuma chicle, mentas, caramelos duros, marihuana, cigarrillos ni tabaco para mascar.

Si tiene problemas o preguntas sobre la preparación, comuníquese con el Centro de Procedimientos al (530) 246-7000